

55 Nr. 28

Lane Medical Library 1868

Ueber
den therapeutischen Werth
des
Chinin.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe,

welche

nebst beigefügten Thesen

mit Erlaubniss der Hohen Medicinischen Facultät der
Universität Greifswald

am 5. August 1868

öffentlich vertheidigen wird

Siegfried Walbaum

aus Münster.

Opponenten:

G. TERFLOTH, Drd. med.

E. HOLTZ, Drd. med.

H. DIESTERWEG, Drd. med.

Greifswald.

Druck der Königl. Universitäts-Buchdruckerei von F. W. Kunike.

1868.

Seitdem in neuester Zeit die exactere chemische und mikroskopische Untersuchung verwerthet wird, um die Wirkung der Arzneimittel genau zu studiren, ist manche unklare Anschauung, die über die Wirkung vieler Mittel herrschte, geklärt, manches als nutzlos erkannte Mittel aus dem Arzneischatze gestrichen, manche bloss hypothetische Auffassung über die Einwirkung dieses oder jenes Mittels auf den menschlichen Organismus als irrig erkannt worden. Trotz dieser stufenweisen Fortschritte bleibt doch in der Pharmacologie noch sehr Vieles zu thun übrig, theils um die Wirkung verschiedener Heilmittel überhaupt festzustellen, theils um sich das Wesen derselben zu erklären.

Zu denjenigen Mitteln, die bisher unter den verschiedenartigsten Indicationen Anwendung fanden, ohne dass man sich das Wesen ihrer Wirkung erklären konnte, gehört in erster Reihe das Chinin. Wir gehen hier ab von dem alten Rufe, den die Chinarinde und ihr Alkaloid gegen Intermittens genossen. Im weiteren Verlaufe der Zeit hat man unserem Mittel

auch eine Reihe anderer Wirkungen zugeschrieben, unter denen die fieberwiedrige und die tonisirende uns zu allen Zeiten immer wieder entgegentritt. Von der Art und Weise dieser Wirkung wusste man sich keine Vorstellung zu machen; aus der Wirkung des Alkaloids gegen Wechselfieber schloss man auf seinen Nutzen in allen Arten von Fiebern, und da man dieselben in der That unter dem Einflusse des Chinin häufig günstig verlaufen sah, so pries man dasselbe vielfach als Febrifugum, während Andere wiederum jeden Einfluss auf den Verlauf von Fiebern absprachen. Dass Chinin wirklich seinen antipyretischen Einfluss oft äussert, beweisen uns die Erfahrungen der neuesten Zeit und besonders die ausgezeichneten Beobachtungen von Liebermeister über seine Wirkung im Abdominaltyphus und anderen Krankheiten¹⁾. Im Verdienst, uns über das Wesen dieser Wirkung des Chinin aufgeklärt zu haben, gebührt hauptsächlich Binz²⁾, der durch seine zahlreichen interessanten Experimente die antipyretische und tonisirende Wirkung des Chinin auf ihre wahren Ursachen zurückführte. Dass auch schon vor Binz, selbst im vorigen

1) Ueber die antipyretische Wirkung des Chinin. Von Liebermeister, Prof. in Basel. Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd. III. S. 23 u. 569 ff.

2) Ueber die Einwirkung des Chinin auf Protoplasma-Bewegungen. Von Dr. C. Binz. Separatabdruck aus M. Schultz Archiv. Bd. III. 1867. — Ferner: Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Chininwirkung. Von Dr. C. Binz, Priv.-Dozent an der Univ. Bonn. Berlin 1868. Verlag von A. Hirschwald.

ahrhundert, Untersuchungen über die eigentliche Wirkung der Chinarinde mit Erfolg angestellt wurden — reichlich, ohne von den Zeitgenossen weiter beachtet zu werden und in wissenschaftlichen Kreisen Ausbeutung zu finden —, beweist die von Binz in der medicinischen Section der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in der Sitzung vom 13. November 1867 (s. Berliner klin. Wochenschrift 1868. Nr. 10. S. 114) und weiterhin in Nr. 13. dieser Zeitschrift S. 145 angegebenen Literatur³⁾.

Im Folgenden werde ich zunächst die Ergebnisse der Binz'schen Untersuchungen in Kürze auseinandersetzen, um dann ihre zweckmässige klinische Verwerthung zu erörtern und an einigen in der hiesigen medicinischen Klinik gemachten Beobachtungen, deren Mittheilung ich der Güte des Herrn Prof. Mosler zu erdanke, darzuthun.

Von der Wirkung des Chinin's gegen Malaria- prozesse, die ihm wohl den Namen eines Specificum's

3) Die älteste hierher gehörige Beobachtung fand er in: J. Pringle, *Observations on the diseases of the army*. 5. Aufl. 1765. In's Deutsche übersetzt von A. E. Brande. Altenburg. 1772. Mit einem Appendix: „Experiments upon septic and antiseptic substances, with remarks relating to their use in the theory of medicine, in several Papers read before the Royal society. S. 20. 22. — Ferner: Polli (in Mailand), über dessen Untersuchungen der antiseptischen Wirkung des schwefelsauren Chinin's referirt ist in Archiv v. Roser u. Wunderlich, 1863. S. 274. R. Gieseler, in v. Langenbeck's Archiv f. klin. Chirurgie, IV., S. 550 S. 564. Hallier, das Cholera-Contagium. Botanische Untersuchungen. 1867. S. 29.

mit Recht verschafft, ausgehend, sah man es weiter
 gegen mancherlei Arten von Krankheitsprozessen,
 gleich den Wechselfiebern mit einem gewissen Typus
 auftraten, wirksam. Wenn dieser Einfluss des Chinin's
 auch nicht verkannt werden kann, so ging man da
 doch offenbar zu weit, indem man eine Unzahl v
 Krankheiten mit und ohne Fieber, bei denen sich au
 nur entfernt irgend ein periodischer Typus aufsuch
 liess, mit unter die Rubrik derjenigen Leiden brach
 die die Anwendung des Chinin's indicirten und ind
 man diese Krankheiten sogar, wie es die Franzos
 thaten, als „maladies à Quinquina“ bezeichnete.
 Die Wirksamkeit des Alkaloids gegen Intermittens u
 andere mit intermittirendem Typus verlaufende Kran
 heiten ist jedoch bis jetzt nur eine empirisch festg
 stellte; wir müssen uns begnügen, sie als eine Th
 sache anzuerkennen, ohne uns eine befriedigende E
 klärung für die Art und Weise dieser Wirkung geb
 zu können. Auch Binz betrachtet dieselbe als
 ungelöstes Räthsel. Dagegen verdanken wir dies
 vortrefflichen Autor, wie schon erwähnt, Aufkläru
 über den antipyretischen Einfluss des Chinin's, den
 auf zwei von einander ganz verschiedene Wirkung
 arten zurückführte, die fäulniss- und gährungswidr
 oder antizymotische und die entzündungswidri
 antiphlogistische. Binz erschliesst dieselbe
 seinem oben citirten Werke aus einer Reihe sehr g
 nau und sorgfältig angestellter Experimente, und mö
 es mir bei der grossen Tragweite dieses Gegensta

es⁴⁾ erlaubt sein, hier eine kurze Uebersicht über die Untersuchungen jenes Autors und deren Resultate anzureihen.

1. Die antizymotische Wirkung des Chinin

Es geht daraus hervor, dass es sich als specifisches Gift für mehrere niederste Organismen zeigt, die als die Erreger von Fäulniss- und Gährungsprozessen längst bekannt sind. Binz experimentirte mit einer höchst verdünnten Lösung des neutralen salzsauren Chinin, von der er einen Tropfen mit einem Tropfen der die Protozoën enthaltenden putriden Flüssigkeit unter's Mikroskop brachte. Um ein genaues Maass für den Wirkungsgrad des Chinin zu haben, verglich er damit auch die Wirkung anderer antiseptischer Mittel und erhielt auf diese Weise folgende Resultate, deren Richtigkeit um so weniger bezweifelt werden darf, als Binz seine Untersuchungen streng und sorgfältig controlirte und häufig — immer mit demselben Erfolge — wiederholte:

1) Die Paramecien und Colpoden der Heu-

4) Zum Belege hierfür diene folgende noch vor wenigen Jahren von Oesterlen („Handbuch der Heilmittellehre“, 6. Aufl. Tübingen 1856. S. 358.) angeführte Contraindication gegen den Gebrauch des Chinin: „Dass entzündliche Affectionen auch anderer wichtiger Organe, acute exsudative Prozesse, sog. active Congestionen u. dgl. Chinin im Allgemeinen verbieten, braucht kaum erwähnt zu werden.“ Wie wir unten sehen werden, stellen wir jetzt diese Contraindication geradezu als Indication auf.

aufgüsse sterben auf Zusatz einer Chininlösung v
1:800 sofort, von 1:20,000 binnen wenigen Stund
ab und zerfallen bald darauf in einen körnigen Detrit
Chinin übertrifft an Schnelligkeit und Intensität dies
Wirkung andere Alkaloide, wie Salicin, Morphiu
muriaticum, Strychn. nitr., ferner ätzende Salze, w
Quecksilbersublimat, Chlorzink, Zinkvitriol, Kupfe
vitriol, endlich sogar Kreosot — lauter Stoffe, die dur
Wasserentziehung aus der Sarcode wirken. (Nur de
hypermangansauen Kali steht es, wenigstens was d
Wirkung auf die grösseren Infusorien betrifft, nach).
Dasselbe Verhalten gegen Chinin zeigen die stärker
Spirillen, Vibrionen und Bakterien, sowie die Infusori
des süßen und Seewassers und des Strandes.

2) Auf die Keimung, Ernährung und Ve
mehrung niederster pflanzlicher Organismen ü
Chinin einen hemmenden Einfluss aus, und zwar
weit höherem Grade, als Kochsalz, Zinkvitriol, Solut
arsenicalis Fowleri, auch als Strychnin; nur von eine
durchaus nicht indifferenten Stoffe, dem Quecksilbe
chlorid, wird es übertroffen. — Unter Verhältnisse
die sonst unbedingt die Entwicklung und Wucheru
des gewöhnlichen Schimmelpilzes (*Penicillium glaucu*
zur Folge haben, wird dieselbe durch Chinin scho
bei 1:500 inhibirt, ebenso wie Chinin den berei
entstandenen Pilz tödtet.

3) Chinin hemmt die Buttersäuregährun
bei der die Bildung von Vibrionen ein wesentlich

actor ist⁵⁾), nach Pasteur⁶⁾ dieselben sogar als Ferment dienen, schon in relativ sehr geringer Menge in auffallendem Grade.

4) Chinin tödtet die in der Atmosphäre schwebenden Sporen oder Samen verschiedener Schimmelattungen, die als Hefenkeime die Selbstgährung des Alkohols einleiten, mit anderen Worten: es hemmt, wie schon Buchheim und Engel⁷⁾ nachgewiesen hatten, auch die weingeistige Gährung, und zwar mehr, als andere Alkaloide.

5) Endlich beeinträchtigt Chinin auch einen gährungsähnlichen Vorgang, der nach Lüders⁸⁾ ebenfalls durch ein lebendes Ferment, durch Schimmelkeime, bedingt wird, nämlich die Umsetzung der Glycoside, so die durch Emulsin bewirkte Umsetzung des Amygdalin in Blausäure, Bittermandelöl und Zucker, des Salicin in Saligenin und Zucker.

II. Die antiphlogistische Wirkung des Chinin.

Das Erkennen derselben ist das Resultat mehrerer Untersuchungen über die Einwirkung des Chinin auf die Protoplasma-Bewegungen verschiedener Protozoen, Bewegungen, für welche sich jenes Alkaloid

5) F. Schultze, Chemie für Landwirthe. 1853. II. p. 224.

6) Animalcules infusoires vivant sans gaz oxygène libre et terminant des fermentations. Comptes rendus. Paris 1861. p. 344.

7) Beiträge zur Arzneimittellehre. I. Heft. 1849. S. 89—93.

8) Ueber Abstammung und Entwicklung von *Vibrio lineola bacterium termo* Dujardin). M. Schultze's Archiv. II. S. 338.

als spezifisches Hemmungsmittel erwies. Hierdurch wurde Binz weiterhin dazu geführt, auch den Einfluss des Chinin auf die selbständigen amöboiden Bewegungen der weissen Blutkörperchen, wie sie nach Lieberkühn⁹⁾ und M. Schultze¹⁰⁾ besonders nach der Mahlzeit hervortreten, zu studiren. Mit Hülfe der von Max Schultze angegebenen künstlichen Erwärmung auf dem heizbaren Objecttisch liess sich auch bei den weissen Blutkörperchen dieselbe bewegungshemmende Einwirkung des Chinin, schon bei 1:2000, constatiren, die die des Strychnin und Morphin noch übertrifft. Weitere dahin zielende Versuche eines Schülers von Binz ergaben, dass Chinin in dieser Wirkung nur von 2 differenten Alkaloiden, Coniin und Veratrin, und ganz zu Anfang vom Campher übertroffen wird. Der Nachweis der antiphlogistischen Wirkung des Chinin stützt sich nun weiterhin auf die wichtige, von Binz bestätigte Beobachtung von J. Cohnheim¹¹⁾, dass die Entzündung in vielen Fällen das Produkt der Vermehrung der weissen Blutkörperchen und ihrer Auswanderung aus den erweiterten Venen und Capillaren sei. Die weissen Blutkörperchen machen nämlich in den Randschichten der Gefässe kräftige amöboide Bewegungen, treten durch die Gefässwandungen hindurch und bilden, als reguläre Eiterzellen weiterwandernd

9) Ueber die Psorospermien. J. Müller's Archiv. 1871. S. 14—17.

10) Archiv für mikroskop. Anat. I. S. 1. ff. Taf. III.

11) Ueber Entzündung und Eiterung. Virchow's Archiv. Bd. 40. S. 1. ff.

und mit den Zellen anderer Gefässe zusammenstossend, im Bindegewebe mit dem ausgetretenen Fibrin die eitrigen Exsudatmassen. Also nicht aus der endogenen Theilung der präexistirenden Zellen der Organe, insbesondere der Bindegewebszellen, sondern aus der Vermehrung und Massenauswanderung der farblosen Blutkörperchen gehen die eitrigen Exsudate hervor. Es lag der Gedanke nahe, dass dieser am Mesenterium des Frosches beobachtete Vorgang mit dem oben erwähnten, auf dem heizbaren Objecttisch wahrgenommenen in Zusammenhang zu bringen sei, und dass die Mittel, die jenen hemmen, auch diesen inhibiren. Diese Voraussetzung haben Binz's Experimente vollkommen bestätigt: durch 24 Versuche, die er an solchen Fröschen (*R. temporaria*) anstellte, bei welchen er früher, um sich von der Richtigkeit der Cohnheim'schen Beobachtungen zu überzeugen, künstliche Mesenteritis hergestellt hatte, kam er zu dem wichtigen Schluss, dass die zuerst (durch Curarin) auffällig vermehrte Zahl der weissen Blutkörperchen durch die subcutane Injection einer relativ geringen Menge Chinin im Schenkel, wenn dieselbe nicht auf mehrere Zeiträume vertheilt wurde, sondern auf einmal geschah, wesentlich vermindert, die Protoplasma-Bewegung in den Randschichten und der Durchtritt sogar oft völlig aufgehoben wurde. „Die beobachtete Abnahme der inflammatorischen Symptome“ (wie Binz selbst l. c. S. 46 sagt), „stand stets in geradem Verhältniss zu der injicirten Quantität des Medicaments, und die Entzündung wuchs

wieder, wenn aus der Länge der Zeit eine partielle Ausscheidung und Zerlegung derselben im Blute unterstellt werden musste.“ — Dasselbe Resultat ergab sich bei lokaler Application des Chinin, wenn eine Lösung desselben (1:500) auf eine Fläche des Mesenteriums gepinselt wurde: die schon vor der Bepinselung gebildeten Eiterzellen zerfielen zu Detritus, das Chinin wurde bald auf dem Wege der Resorption auch in's Blut aufgenommen, und die Vermehrung und amöboiden Bewegungen der weissen Blutzellen hörten auf.

Um auch auf Warmblüter sein Experiment auszudehnen, untersuchte Binz auch das der Schenkelvene entnommene Blut junger Katzen, die er vorher stark mit kräftiger animalischer Nahrung gefüttert hatte, bei einer Vergrösserung von Hartnack's System Nr. 7 und fand, dass die hierdurch hervorgerufene bedeutende Bewegung und Vermehrung der weissen Blutzellen auf Zusatz von Chinin erheblich vermindert wurde, ein Resultat, das er sogar durch genaues Zählen derselben in mehreren Gesichtsfeldern controlirte. — In allen diesen Fällen bemerkte er an den rothen Blutkörperchen keine Veränderung. — Dass nur die Chinin-Injection es war, welche den Entzündungs-Vorgang in diesen Fällen sistirte, beweist die jedes Mal beobachtete Thatsache, dass nach Verlauf einer gewissen Zeit die weissen Blutkörperchen wieder dieselben Protoplasma-Bewegungen zeigten, wie vorher, und dass dann eine neue Chinin-Application (die aber schwächer sein durfte, als die erste) dieselben auf's Neue hemmte.

Diese Beobachtungen mussten hier mitgetheilt werden, um aus ihnen die unberechenbare praktische Bedeutung des Chinin ableiten zu können. Eine richtige Würdigung derselben und eine klare Einsicht in die Wirkung des Chinin vermag dieser kurze Ueberblick zwar nicht zu geben; dazu bedarf es der Lectüre der oben citirten Schrift selbst, in der Binz ausführlich und mit grösster Präcision seine Beobachtungen entwickelt hat.

Anwendung des Chinin.

I.

Die von Binz nachgewiesene Wirkung des Chinin indicirt folgerichtig dessen Anwendung in einer grossen Reihe von Krankheiten, bei denen freilich — zum Theil wenigstens — seine Empfehlung bis jetzt nur eine auf theoretischer Grundlage basirte sein kann und es also noch der praktischen Verwerthung bedarf, um dem Chinin die eigentlich gebührende Anerkennung zu verschaffen.

Um zunächst von unserem Mittel als Antizymoticum zu sprechen, so gehören in erster Reihe hierher alle die häufigen Magen- und Darmkatarrhe, die dem Import von durch Pilze verdorbenen Nahrungsmitteln ihre Entstehung verdanken. Wir beginnen von der einfachsten Form der Magencatarrhe: wie häufig lässt sich, namentlich in grossen Städten, bei denselben kein anderes ätiologisches Moment nachweisen, als der Genuss von Trinkwasser, das durch eine Menge von

Protozoën verunreinigt ist. Hier dürfte Chinin den Werth eines eigentlichen Desinfectionsmittels, eines Antidots beanspruchen. — Wenn in solchen Fällen sich Chinin bewährt, so ist seine Anwendung auch nicht minder gerechtfertigt in solchen Magenaffectionen, die durch Genuss anderer in Folge von Pilzanhäufung verdorbener Getränke, wie saurer Biere, saurer Weine, saurer Milch etc. hervorgerufen sind. — Weiterhin sind hierher zu rechnen alle diejenigen Formen von Gastritis toxica, die durch den Genuss von verdorbenem Fleisch, verschimmeltem Brode, von verdorbenem Käse oder verdorbener Wurst (in Folge des sog. Käse- oder Wurstgiftes) bedingt sind. Diese Fälle sind im gewöhnlichen Leben so häufig, die dabei auftretenden Magen- und Darm-Affectionen sind oft so schwerer Natur, dass Versuche mit einem Mittel, welches sich theoretisch so glänzend empfiehlt, wie Chinin, sich wohl der Mühe verlohnen würden. — In keinem Gebiete ist dieser Punkt von grösserer Bedeutung, als in der Kinderpraxis. Wie häufig sehen wir, vor Allem in der heissen Jahreszeit, Kinder, zumal der ärmeren Klassen, mit Kuhmilch gefüttert werden, in der bereits die Milchsäuregährung begonnen hat! Und wenn auch auf das Frischsein und die Güte der Milch die minutiöseste Aufmerksamkeit, die schärfste Controle verwandt wird, so sind doch — wie v. Niemeyer ¹²⁾ mit Recht hervorhebt — bald die geringsten Unrein-

12) Lehrbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. 6. Aufl. 1865. I. S. 479. In welchem Buche v. Niemeyer die Anwendung des Chinins bei Magenaffectionen ausführlich behandelt.

lichkeiten in den Milchgefässen, bald die Unsitte der Nutschbeutel, bald zu wenig Sorgfalt bei der Säuberung des Mundes der Kinder Gründe genug für die Zersetzung der Milch und selbst der Muttermilch, bevor sie in den Magen gelangt. Diese Uebelstände haben freilich in neuester Zeit — in grösseren Städten wenigstens — der Liebig'schen Nahrung als Ersatz für die Milch vielfach mit Erfolg Eingang verschafft; aber nie wird der Gebrauch der Milch ganz verdrängt werden können, und wenn man bedenkt, welch' jammervolle Zustände durch die sauren Zersetzungsprodukte solcher Milch bei den armen kleinen Wesen hervorgerufen werden können¹³⁾, wenn man berücksichtigt, wie häufig sie hierbei einem frühen Marasmus verfallen und langsam unter grässlichen Qualen dahinsterven, so wird man doch ein Mittel nicht unversucht lassen, von dem man sich a priori mit Recht Erfolg versprechen darf.

Nicht minder häufig, wie die genannten Formen von Magencatarrhen, sind diejenigen, die durch abnorme Zersetzung der Ingesta in Folge von verminderter Secretion des Magensaftes entstehen, sei es, dass hieran die abnorme Menge oder die Schwerverdaulichkeit der eingeführten Stoffe Schuld ist. Wir wissen durch Binz's treffliche Untersuchungen, dass die Milch-, die Buttersäure-, die Essiggährung durch Chinin gehemmt werden; warum sollen wir dasselbe nicht in den unendlich zahlreichen Fällen in

13) Vgl. *ibid.* S. 491, wo diese Zustände meisterhaft geschildert sind.

Anwendung bringen, wo die eingeführten Amylaceen in Zucker und demnächst in Milch- und Buttersäure übergeführt werden, wo das genossene Bier oder der Wein der Essiggährung unterworfen ist? Der Umstand, dass Chinin im Vergleich zu den bisher häufig benutzten Antizymoticiis, wie Calomel, Tannin, Kreosot, Nux vomica, so indifferenter und ungefährlicher Natur ist, sollte uns um so mehr zu Versuchen mit demselben drängen. Wenn v. Niemeyer sagt (l. c. S. 496 ff.): „Durch die Indicatio causalis wird in solchen Fällen gefordert, dass der Zersetzung der Magencontenta, welche trotz des Erbrechens und Abführens im Magen zurückbleiben, Einhalt gethan werde. Diese Aufgabe ist schwer zu erfüllen, und oft genug scheitert an ihr die Kunst der Aerzte“ u. s. w., so haben wir im Chinin jetzt ein Mittel, das diesen Anforderungen wohl entsprechen dürfte, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, dass ein Stoff, der ausserhalb des Organismus der Gährung und Zersetzung entgegenwirkt, innerhalb desselben die nämliche Wirkung äussern wird. Um der letzteren sicher zu sein, müsste freilich die Dosis entsprechend gross genug gewählt werden; denn es handelt sich hier um eine abnorme Wucherung derjenigen Pilzformen, die fast in und auf jedem gesunden Körper vorkommen, ohne Krankheitserscheinungen zu veranlassen. -- Gab man in derartigen Fällen bisher vielfach die Tinct. Chinae composita als „Tonicum“ oder „Stomachicum“, so konnte man freilich von diesem Mittel, das wenig Chinin, daneben aber noch andere wirkungslose Be-

standtheile enthält, um so weniger einigen Einfluss auf die Unterbrechung der Gährung sehen, als es in zu geringer Gabe verordnet wurde. — Auf die Dosirung des Chinin werde ich noch unten zurückkommen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass Chinin, wenn es sich in diesen Fällen bewährt, auch den concomitirenden Darm-Affectionen Einhalt thun wird. Gegen diese empfiehlt bereits Binz (l. c. S. 13 ff.) das Mittel auf Grund seiner den niedersten Organismen feindlichen Wirkung.

II.

Während in den vorstehend genannten Fällen das Chinin noch der Empfehlung durch die praktische Erfahrung bedarf, ist seine fäulnisswidrige Wirkung in einer anderen Reihe viel schwererer Erkrankungen theilweise schon durch manche Beobachtungen bewährter Forscher erprobt. Es sind dies die Erkrankungen, bei denen es sich um Aufnahme septischer Substanzen in's Blut handelt, die wir daher kurzweg als septische Krankheiten bezeichnen wollen. Hierher gehören die asiatische Cholera, der Typhus, die Pyämie u. a. — Bei Cholerakranken freilich sind meines Wissens vom Chinin bis jetzt noch keine Erfolge beobachtet worden. Seine Empfehlung stützt sich hier einestheils auf die Untersuchungen über das zahlreiche Vorhandensein von Micrococcus- und anderen Pilzformen auf der Darmschleimhaut der Cholerakranken, anderntheils auf die auch von Binz (S. 11 und 12) citirte, von Hallier in seiner oben ange-

führten Schrift mitgetheilte antiseptische Wirkung des Chinin auf Fleisch, das mit Choleradejectionen zusammen einer hohen Temperatur ausgesetzt war. Ueber die Natur des Choleragiftes, das ja erst jüngst von Dr. G. Schmid in Wien als Cyanverbindung angesprochen ist, sind wir jedoch noch zu sehr im Dunkeln, als dass wir auf Grund derselben eine bestimmte Therapie mit Zuversicht empfehlen könnten; ausserdem bietet die innere Anwendung des Chinin, wie auch Binz hervorhebt, unüberwindliche Schwierigkeiten. Immerhin würde sich jedoch die hypodermatische Injection möglichst starker Chininlösungen (s. unten) bei der Cholera empfehlen und sollte bei derselben eigentlich nie unversucht bleiben.

Ganz anders verhält es sich bei einer Krankheit, die in neuester Zeit so viele Forscher beschäftigt, nämlich beim Typhus. Wir wissen, dass der Typhus durch Aufnahme eines fauligen Stoffes in's Blut entsteht; wir wissen, dass viele Typhen nur Fermentationsvorgänge sind, ja, wir dürfen es nach den Untersuchungen von Tigri, Coze, Feltz, Lüders, Hensen, die im Blute Typhuskranker Bakterien gefunden haben, als höchstwahrscheinlich betrachten, dass bei diesen Prozessen niederste Organismen Fermentationen bewirken. Wenn somit das Chinin sich beim Typhus schon theoretisch empfiehlt, so wird diese Empfehlung noch glänzend bestätigt durch die klinischen Erfahrungen der letzten Jahre über die durch Chinin erzielten Erfolge beim Typhus abdominalis wie exanthematicus. Diese Erfahrungen haben ergeben, dass Chinin mit

em anderen mächtigen Factor der Typhusbehandlung, dem kalten Wasser, auf gleiche Linie zu stellen ist, dass es dieses ergänzt, wo es nicht ausreicht, dass es als ausgezeichnetes Ersatzmittel für dieses dient, wozu letzteres wegen drohender Herzschwäche oder aus anderen Gründen contraindicirt ist. Wir dürfen sogar behaupten, dass das kalte Wasser hauptsächlich nur palliativ wirkt, indem es gegen das schlimmste Symptom des Typhus, das Fieber, zu Felde zieht, während Chinin dagegen die Ursache des Typhus, die Blutsepsis, direkt bekämpft. Liebermeister gebührt das ausgezeichnete Verdienst, den Nutzen des Chinin im Ileotyphus in seiner oben citirten Arbeit zuerst praktisch nachgewiesen zu haben. Er hat in derselben sogar die Zeitdauer bis zum Eintritt der Wirkung des Chinin durch Durchschnittszahlen genau festgestellt. Seine Beobachtungen zeigen, dass das Thermometer den besten Massstab für den Grad der Wirkung des Chinin abgibt, dass die Temperatur bei- nahe oder vollkommen bis zur Norm herabsinkt, wenn entsprechend grosse Dosen Chinin gegeben worden, im entgegengesetzten Falle aber steigt. Man hat in- dem Recht, wenn man das Chinin als antipyre- tisches, antifebriles Mittel bezeichnet; da es aber die Indicatio causalis genügt, da es, dauernd gegeben, zweifelhaft den Verlauf des Typhus wesentlich ab- kürzt, indem es die Ursache der Blutsepsis unschäd- lich macht, so dürfte man es wohl mit mehr Recht ein antizymoticum, Antisepticum nennen. Wahrscheinlich auch die früher und jetzt häufig angeführte „toni-

sirende“ Wirkung des Chinin auf die antiseptische Wirkung zurückzuführen; denn ein Mittel, das durch seine Effecte einer so entkräftenden Potenz, wie dem Fieber, Einhalt thut, dürfen wir wohl indirekt als „Tonicum“ bezeichnen. — Noch auf einen Punkt möchte mir gestattet sein, hier aufmerksam zu machen, das wahrscheinlich bisher noch nicht hinreichend gewürdigt worden ist. Dass Chinin beim Typhus, wie bei den übrigen septischen Krankheiten, seine Einwirkung auf die chemischen Vorgänge in Lymphe und Blut ausübt, äussere, hat bereits Binz (l. c. S. 26.) nachgewiesen. Der Zusammenhang von Veränderungen im Blute mit Veränderungen im Lymphsystem ist eine immer sich wiederholende Erscheinung. Beim exanthematischen Typhus wie beim Ileotyphus finden wir eine Affection des Lymphdrüsensystems: bei jenem schmerzhaftes, entzündliches Anschwellen der Lymphdrüsen, besonders der Cervical- und Inguinaldrüsen, bei diesem hauptsächlich die Filtration der Peyer'schen Plaques des Dünndarms und der Mesenterialdrüsen, bei beiden Milztumor. Auch diese acuten Drüsenschwellungen beruhen auf endogener Kern- und Zellenbildung; immer finden wir dabei eine Vermehrung der Lymphkörperchen. Wenn wir die weissen Blutkörperchen mit den Lymphkörperchen identifizieren, so können wir dem Chinin, das ja jene Erscheinungen Einhalt thut¹⁴⁾, beim Typhus ausser der antiseptischen auch eine antiphlogistische Wirkung zuschreiben. Wir sind jedoch über den Zusammen-

14) In Betreff des Milztumors vgl. Binz, l. c. S. 34.

ang zwischen miasmatischen Krankheiten und der Vermehrung der weissen Blutkörperchen noch zu wenig aufgeklärt, als dass wir sichere Schlüsse aus jenem Verhalten ziehen könnten, und muss dies weiterer Forschung überlassen bleiben¹⁵⁾. — Für den Petehialtyphus hat Mosler¹⁶⁾ die erfolgreiche Anwendung des Chinin nachgewiesen. Am Schlusse dieser Arbeit werde ich mir erlauben, einige weitere Beobachtungen über den Nutzen unseres Alkaloids im Abdominal- und exanthematischen Typhus anzureihen.

Von der Pyämie ist es uns ebenfalls bekannt, dass sie das Produkt einer durch Fermentationsvorgänge erzeugten Zersetzung ist, die gewöhnlich durch einen zerfallenden Thrombus gebildet wird. Aber wir haben daneben auch in den zahlreichen lokalen Exudationen und Eiterbildungen ein Resultat der Verhehrung und Massenauswanderung der weissen Blutkörperchen. Wir haben also die doppelte Indication, antizymotisch und antiphlogistisch einzuwirken, und wenn dieser Indication durch Chinin so häufig nicht genügt werden kann, so liegt dies darin, dass der Prozess der purulenten Infection zu rapide um sich greift, dass Chinin, dem Blute einverleibt, nur die weitere Verhehrung und den Durchtritt der weissen Blutkörperchen durch die Gefässwandungen hemmt, nicht aber die bereits durchgetretenen, vielleicht schon zu Eiter-

15) Vgl. Binz, l. c. S. 35.

16) Erfahrungen über die Behandlung des Typhus exanthematicus. Mit 1 Tafel. Greifswald 1868.

körperchen gewordenen, zerstört¹⁷⁾, dass der Krank in der Regel zu sehr heruntergekommen ist, um die Arznei zugänglich zu sein, dass endlich, der colossalen Ausbreitung des Prozesses entsprechend, enorme Dosen Chinin gegeben werden müssten, die auch einem kräftigeren Organismus schädlich werden könnten. Dennoch ungeachtet hat Eulenburg in einem sehr schleichen verlaufenen Falle von Pyämie eine deutliche Wirkung wiederholter subcutaner Chinin-Injectionen auf die Herabsetzung von Temperatur und Puls wahrgenommen¹⁸⁾. Er löste 2 Grammes Chinin in 15 Wasser mit Zusatz der zur Lösung nöthigen Menge Acid. sulph. dilutum und injicirte jedes Mal 0,9 Grammes der Lösung, also etwa 0,12 Grammes Chinin.

Noch eine Reihe anderer Krankheiten könnten wir nennen, bei denen Chinin auf Grund seiner fäulniswidrigen und gährungswidrigen und seiner antiphlogistische Wirkung Empfehlung verdient, und auch theilweise schon mit Erfolg Anwendung gefunden hat, besonders Puerperal-Peritonitis, Erysipelas, Eiterungsfieber der Variola, Nosocomial-Gangrän u. a.¹⁹⁾; jedoch würde dies die engen Grenzen einer Dissertation überschreiten.

Eine offene Frage ist noch die, ob Chinin auch im Stande sei, den entzündlichen Exsudaten auf Schleim-

17) Vgl. Binz, l. c. S. 46.

18) Untersuchungen über die Wirkung subcutaner Injectionen. Centralbl. für d. med. Wissensch. 1863. Nr. 46, und 1864. Nr. 3.

19) Gieseler gebrauchte es auch äusserlich mit Erfolg bei Noma, Angina diphteritica, Carbunkeln etc. Vgl. Binz l. c. S. 47.

äute und in parenchymatöse Gewebe entgegenzuwirken. Hierüber fehlen uns noch positive Untersuchungen²⁰⁾. Wenn wir indess die von Liebermeister in seiner oben citirten Arbeit mitgetheilten Erfahrungen über die antifebrile Einwirkung des Chinin bei Pneumonien, Pleuritiden, acuten Gelenkrheumatismen und anderen heftigen Krankheiten berücksichtigen, wenn wir den Beobachtungen jenes bewährten Forschers Glauben schenken, dass es nicht allein eine Mässigung des Fiebers, sondern auch eine Abnahme der psychischen und anderen begleitenden Störungen, kurz vollkommenes Wohlbefinden herbeiführe, so können wir uns dieser Ansicht nicht verschliessen, dass auch in jenen Fällen Chinin seine antiphlogistische Wirkung äussere. Es weitere gewichtige Stimmen für diese Anwendung des Chinin dürfen wir Skoda, der es in intermittirenden Pneumonien empfiehlt, sowie Vigla (Archive de Médecine. Juillet 1853) und namentlich Briquet anführen, welche Beide es im acuten Gelenkrheumatismus empfehlen. Briquet sagt sogar in seinem „Traité thérapeutique du Quinquina et de ses préparations“, 2^{me} édit. Paris 1855. p. 590: „Dans la fièvre typhoïde, le rhumatisme articulaire aigu, les hémorrhagies, les névralgies et les névroses intermittentes, enfin dans tous les cas, où l'on veut entraver un travail imminent de suppuration, on doit donner le sulfate de quinine à des doses de 2 à 4 grammes par jour.“ — Nach die nachstehenden Krankengeschichten (B.) über

²⁰⁾ Vgl. Binz, l. c. S. 57.

den Verlauf einiger in der hiesigen medicinischen Klinik behandelter Pneumonien dürften zur Evidenz zeigen, dass Chinin auf den Verlauf derselben als Antiphlogisticum einwirkt, dass es die Temperatur merklich herabsetzt und die Defervescenz des Fiebers zu beschleunigen vermag. Welche Erscheinungen diesen Thatsachen zu Grunde liegen, ist Sache weiterer Forschungen.

Form und Dosirung des Chinin.

Wir haben oben gesehen, dass man Chinin, besonders als Febrifugum, früher sehr häufig angewandt. Wenn man davon meist keine deutlichen Erfolge sah, so hat dies, wie Binz treffend ausführt²¹⁾, einen doppelten Grund: 1) die zu schwache Dosirung des Mittels, und 2) die unvollkommene Resorption im Magen und Darmkanal. — Was den ersten Punkt betrifft, scheint man bei der Dosirung zu ängstlich gewesen zu sein, man scheute sich vor den Chininsymptomen, dem Eingenommenheit des Sensoriums, dem Ohrensausen, kurz, dem sog. Chininrausch. Dass dies ungerechtfertigte Befürchtungen waren, weist Binz, auf den ich hier verweise, an verschiedenen Fällen aus der Literatur nach, in denen selbst nach Dosen von 7–8 Grammes pro die keine Vergiftungssymptome eintraten. In der hiesigen medicinischen Klinik liessen sich selbst nach der Anwendung sehr grosser Dosen Chinin

21) L. c. S. 57.

in seltensten Fällen üble Folgen constatiren. Wenn andererseits auch manche Beispiele in der Literatur finden, in denen Chinin mit nachtheiligem Erfolge verabreicht wurde²²⁾, so müssen wir dies wohl wesentlich auf Rechnung des zweiten Punktes, der mangelhaften Resorption, setzen, und ist in dieser Beziehung der Modus, wie er bei Intermittenten vielfach gebräuchlich war und theilweise noch ist, vor der Verordnung des Chinin ein Emeticum zu verabreichen, nur zu billigen. — Dass das Chinin nur in relativ grossen Dosen seine antizymotische und antiphlogistische Wirkung äussern kann, geht auch aus Binz's Experimenten hervor, denen zufolge das Mittel nur innerhalb der Grenzen einer gewissen Concentration seine Effekte zeigt, jenseits derselben aber fast wirkungslos ist. Wenn auch diese Berechnung für die Praxis nicht massgebend ist, weil sie die Verordnung von Dosen verlangt, die sich thatsächlich nicht anwenden lassen, so genügt sie doch vollkommen, um uns den Nachweis zu liefern, dass geringere als Scrupeldosen die gewünschten Wirkungen im Allgemeinen nicht hervortreten lassen. — Ferner ergeben jene Versuche die für uns wichtige Lehre, grössere Dosen Chinin lieber auf einmal, als in Zwischenräume vertheilt, anzuwenden. Dass in der That Scrupeldosen Chinin, zumal am Anfang gegeben, die Wirkung desselben meist schon am folgenden Tage zum Vorschein kommen lassen,

22) Vgl. Oesterlen, l. c. S. 350. Anmerkung, wo die einschlägige Literatur angegeben ist.

beweisen auf's Glänzendste die Beobachtungen v. Liebermeister im Typhus abdominalis und die weiter unten zu erwähnenden Beobachtungen aus der hiesigen Klinik.

Der zweite Punkt, die unvollständige Resorption des Mittels, ist häufig eine Folge catarrhalischer Zustände des Magens, in der Regel durch Ueberfüllung mit Speisen. Während man in solchen Fällen früh nachdem man ein Brechmittel gegeben, der entstandenen und weiter um sich greifenden Zersetzung gegenüber sich ziemlich ohnmächtig sah, haben wir es jetzt in der Hand, durch Chinin derselben Schranken zu setzen. Ich wiederhole, dass die Anwendung des Chinin in diesem Falle durchaus nicht die vorherige Entleerung der Magencontenta contraindicirt, letztere vielmehr häufig ein treffliches Unterstützungsmittel der Therapie ist. Für die Resorption des Chinin gibt uns dann der Nachweis desselben im Harn den besten Maassstab ab. — Hinsichtlich der Resorptionsfähigkeit macht uns weiterhin Binz auf einen Umstand von grosser praktischer Tragweite aufmerksam, dass nämlich das bisher officinelle und allgemein gebräuchliche basisch schwefelsaure Salz etwa 800 Theile Wasser zu seiner Auflösung bedarf, — ein Uebelstand, der freilich durch Neutralisiren mit Schwefelsäure aufgehoben werden kann, — wogegen das neutrale salzsaure Chinin sich schon in 60 Theilen Wasser löst und durch Zusatz von etwas Salzsäure dem physiologischen Verdauungsvorgange noch adäquater gemacht werden kann. — In Folge hiervon wird jetzt in der hiesigen me-

cinischen Klinik nur das *Chinium muriaticum* oder nach Jürgensen's Vorschlag neuerdings das *Chinium sulphuricum*, in Salzsäure gelöst, mit Glück angewandt.

Die tägliche Dosis des Chinin müsste demnach mindestens 0,5—0,6 Grammes (bei kleinen Kindern) betragen; man kann, wie wir sahen, in schlimmen Fällen beim Erwachsenen bis zu 7—8 Grammes pro die steigen. — In den oben erwähnten Formen von Magencatarrhen würde man 1—2 Grammes pro die, höchstens auf 2 Zeiträume vertheilt, geben; bei Kindern wird man mit 0,5—1 Gramme pro die anfangen und kann nöthigenfalls mit der Dosis steigen. — Bei zymotischen Krankheiten, Typhus, Puerperalfieber, Pyämie, gebe man dreiste Dosen, beginne mit 2 Grammes, wenn die Temperatur 40° C. erreicht hat, und steige ungescheut bis zu 5—6 Grammes pro die. Die beste Zeit für die Verordnung ist in den letztgenannten Fällen der Abend. Bei der Pyämie wird man mit Erfolg die von Eulenburg empfohlene subcutane Injection (s. oben) von Chinin anwenden. — Bei der asiatischen Cholera mache man mehrmals täglich eine subcutane Injection von 2—4 Grammes einer Chininlösung von 1:8, wie sie von W. J. Moore (Lancet. II. 5. Aug. 1865) bei Intermittens empfohlen worden ist²³⁾.

23) Die subcutanen Injectionen bieten bekanntlich den Vortheil, dass die injicirten Mittel unverändert, schneller und in der vollen eingespritzten Quantität von den Lymphgefäßen resorbirt und in's Blut aufgenommen werden, und dass es aus diesem Grunde nur der Hälfte der per os eingeführten Arzneimenge bedarf. Es ist klar, wie wichtig dies bei der Verordnung des Chinin ist, bei dem über-

— Bei Pneumonien, acuten Gelenkrheumatismen und anderen entzündlichen Krankheiten gebe man Chinin in der täglichen Dosis von 1,5—3 oder 4 Grammes, bei Pneumonien passend mit einem Infusum foliorum Digitalis (0,6 auf 200 Grammes).

Krankengeschichten.

A. Typhen.

Typhus abdominalis.

Wie wir schon oben erwähnten, ist die rationellste und hinsichtlich des Verlaufes erfolgreichste Behandlung des Typhus diejenige, bei der die Anwendung des kalten Wassers mit dem fortgesetzten Gebrauch grosser Dosen Chinin Hand in Hand geht. Folgender Fall wird dies zeigen:

1) Friedrich Sch., Schmiedegeselle, 32 J. alt, früher bis auf ein angeblich im 9. Jahre überstandenes „Nervenfieber“ immer gesund, wurde am 30. Januar 1868 von Frösteln, Kopf- und Nackenschmerzen, Ohrensausen, Leibschmerz, Durchfall, Fieber befallen, welche Symptome sich steigerten und seine Aufnahme am 6. Februar, also am VII. Tage der Krankheit, veranlassten. Bei derselben die

dies der Manchem unerträgliche bittere Geschmack so vermieden wird. — Wenn von Moore an der Injectionsstelle mehrmals Entzündung beobachtet wurde, so ist dies wahrscheinlich eine Folge der unvollständigen Lösung des Präparats, also durch Anwendung des löslicheren Chin. hydrochl. zu vermeiden. Erlenmeyer („die subcut. Inject. d. Arzneimittel.“ 3. Aufl. Neuwied u. Leipzig 1866. pag. 95.) hat in keinem Falle von hypodermatischer Chinin-Injection — deren er eine grosse Zahl gemacht hat — eine Entzündung folgen sehen.

exquisitesten Symptome eines Ileotypus. Die Temperatur erreichte, wie die Curve I. (s. Taf.)²⁴⁾ zeigt, keine sehr bedeutende Höhe; doch stellte sich beim Pat. häufiges, reichliches Nasenbluten und sehr grosse Schwäche ein. Am 15. Februar erfolgten, nachdem schon am Tage vorher die Douche ausgesetzt war, wieder breiige Stuhlgänge; am 17. Februar fast völliges Wohlbefinden, guter Appetit, nur noch grosse Schwäche.

Dass auch die Chininbehandlung allein im Stande ist, den Verlauf des Ileotypus abzukürzen und die Symptome zu mässigen, zeigt folgender Fall:

2) Julius H. (Curve II.), 23 J. alt, Schuhmachergeselle, von ziemlich kräftigem Körper, wurde, nachdem er vor 10 Tagen von schwerem Allgemeinleiden befallen worden war, am 25. October 1867 mit ausgeprägten Typhussymptomen aufgenommen. Temperatur bedeutend erhöht, Urin etwas eiweisshaltig; Delirien. Bedeutende Schmerzen in allen Gliedern. Am 30. Octbr. erfolgen breiige Stuhlgänge. Vom 2. Novbr. ab sank in Folge des fortgesetzten Chiningebrauchs, mit dem nur kalte Umschläge um den Kopf verbunden wurden, die Temperatur fast bis auf die Norm, vom 4. ab ist gar kein Fieber mehr vorhanden, der Puls jedoch sehr verlangsamt, die Milzvergrösserung nur noch unbedeutend; sonst völliges Wohlbefinden, sodass am 7. mit dem Chinin ganz nachgelassen wird und Pat. am 30. December vollkommen geheilt entlassen werden kann.

In den genannten Fällen wurde Chinin in ziemlich grossen Dosen gegeben. Von welchem Einflusse dies ist, um wie viel langsamer solche Typhen verlaufen, in denen kleinere Gaben Chinin angewandt werden, beweist der folgende Fall, in dem nicht über 10 Gran pro die verabreicht wurden:

3) Eduard L. (Curve III.), Handlungsdiener, 21 Jahre alt, schwächlich gebaut, will als Kind an Masern und Ruhr gelitten, im

24) In den Curven entsprechen die vertikalen Striche je gr. v Chinin, die horizontalen je einem kalten Vollbade; die Punkte über den vertikalen Strichen bedeuten je eine kalte Brause.

Uebrigen aber keine Krankheit gehabt haben. Schon 3 Wochen vor seiner Aufnahme fühlte er sich unwohl und litt an beständigen Diarrhöen, die jedoch medicamentöser Behandlung wichen. Seit 8 Tagen heftige Verschlimmerung mit Diarrhöen, Fieber, Ohnmachten, Eingenommenheit des Kopfes, die seine Aufnahme in die Klinik am 28. Juni 1867 veranlassten. Ausgeprägter Typhus abdominalis, völlige Apathie. Die Temperatur steigt nicht excessiv hoch. Ausser Chinin erhält Pat. Säure in einer Mixtur und verdünnten Wein. Das Sensorium bleibt lange stark eingenommen. Erst am 9. Juli tritt besseres Befinden und Abfall der Temperatur ein; der Stuhlgang bleibt jedoch noch mehrere Tage dünn. Die eigentliche Reconvalescenz beginnt erst am 13. Juli, sodass Pat. am 24. entlassen werden kann.

Die Krankheitsdauer betrug in diesem Falle also, wenn wir das Leiden vom Beginne des Recidivs und nicht — wie dies vielleicht geschehen muss — vom ersten Unwohlsein an datiren, 22 Tage, mithin längere Zeit, als in den übrigen Fällen, die mit grossen Dosen Chinin allein oder combinirt mit hydrotherapeutischen Massregeln behandelt wurden.

Typhus exanthematicus.

Dass auch der Flecktyphus am besten durch combinirte Chinin- und Kaltwasserbehandlung bekämpft wird, dafür mögen die folgenden Fälle als Beleg dienen, die der im Frühling und Sommer 1867 und theilweise auch im Winter 1868 in Neuvorpommern herrschenden Epidemie angehören und sich durch ihren schweren Verlauf auszeichnen:

1) August O. (Curve IV.), Tischler, 30 J. alt, kräftig gebaut, früher im Ganzen gesund, bekam am 22. April 1867, angeblich in Folge einer Erkältung, einen Frost mit Kopfschmerz, Erbrechen, Appetitmangel, allgemeiner Mattigkeit, Verstopfung und

quälendem Husten, wodurch seine Aufnahme am 29. April 1867 erfordert wurde. Haut mit zahlreichen Petechien bedeckt, Bauchdecken nicht gespannt, Ileocöalgurren; Zunge trocken; in den hinteren unteren Partien des Thorax einzelne kleinblasige Rasselgeräusche; die Percussion ergibt nirgends Anomalieen. Urin enthält wenig Eiweiss. In den folgenden Tagen stieg die Temperatur sehr hoch; nach Gebrauch von Calomel traten Diarrhöen und Erbrechen ein. Nasenbluten. Milz bedeutend vergrössert; Delirien. Stierer Blick; stertoröses Athmen. Puls klein, fast Pulsus duplex. Zunge trocken, glänzend, mit glasieriger Borke; Decubitus. Die Temperatur sank zwar nach anhaltendem Chiningebrauche vom 4. Mai ab, um jedoch am 7. Mai wieder auf 40° C. zu steigen. Nach Application der kalten Douche fiel sie indess wieder herab. Am 9. Mai beginnende Parotitis, die in den folgenden Tagen unter erheblichen Schmerzen zunahm. Am 11. Mai Furunkel auf dem Thorax rechts, ein Carbunkel in der Gegend der proc. spinosi der letzten Rückenwirbel. Am 12. Mai Oedem der rechten Gesichtshälfte. Lagerung auf den Bauch. Nach wiederholten Incisionen in die Parotitis und die Carbunkel waren dieselben am 2. Juni grösstentheils zurückgegangen; die in Gangrän übergegangene Stelle des Carbunkels, die schön granulirt, wird mit Lapis touchirt, ist jedoch erst am 24. Juli nach häufig wiederholter Bepinselung ganz vernarbt und kann Pat., da Puls und Temperatur schon seit dem 19. Mai normal, auch das Allgemeinbefinden gut geworden war, am 24. Juli entlassen werden.

2) Wilh. P. (Curve V.), 29 J. alt, Schornsteinfeger, von leidlich genährtem Körper, will in seiner Jugend Scarlatina und Morbilli, im J. 1855 einen acuten Gelenkrheumatismus, 1861 eine Fractura radii dextri überstanden haben. Am 21. April 1867 wurde er, angeblich nach einer Ueberanstrengung mit Erkältung, von Brustschmerzen, Luftmangel, Mattigkeit, bedeutender Schmerzhaftigkeit sämmtlicher Muskeln, nächtlichen Delirien, starker Hitze. Kopfschmerz, Herzklopfen, Durchfall, Durst befallen und daher am 30. April in die Klinik aufgenommen. Die gelblich colorirten Hautdecken mit zahlreichen Roseolae bedeckt; Gesicht geröthet, Bauch aufgetrieben, Ileocöalgurren deutlich. Zunge trocken; Foetor ex ore. Milzdämpfung vergrössert. Albuminurie. Er erhielt Säure in Mixtur. Temperatur und Puls bedeutend erhöht; erstere steigt am

3. Mai sogar auf $41,5^{\circ}$ C., fällt jedoch nach Gebrauch eines Scrupels Chinin auf $38,6^{\circ}$ und bald ganz auf die Norm herab. Die Delirien dauern in grosser Häufigkeit noch bis zum 7. Mai fort, Faeces und Urin gehen unwillkürlich ab; am 7. Mai beginnt jedoch die Reconvalescenz, die Zunge reinigt sich, Urin wird normal, und kann Pat. am 21. Mai entlassen werden.

3) Wilh. W. (Curve VI), Ziegler, 22 J. alt, früher immer gesund, von mässig kräftigem Körper, erkrankte am 19. Februar 1868 an Frost, mit Hitze abwechselnd, Kopfschmerz, Mattigkeit, Appetitmangel, Husten, wobei jedoch der Stuhlgang regelmässig geblieben sein soll. Bei der Aufnahme am 21. Februar zeigt sich das Sensorium frei; Zunge mit weissem Belage, an den Rändern geröthet; Milz 10 Ctm. lang, 6 Ctm. breit; Abdomen etwas eingezogen, nicht schmerzhaft. Pat. erhält Säure in Mixtur. Die erhöhte Temp. sinkt durch Douchen und Chinin immer um $1-2^{\circ}$ C. Heftiges Nasenbluten. Am 24. Februar einzelne Roseolae, vom 25. ab Diarrhöen. Am 26. zahlreiche deutliche Petechien, Ileocöcalgurren; fossa iliaca dextra auf Druck schmerzhaft. Am 27. Februar muss wegen einer Ohnmacht von der Douche abgestanden werden; 25 Gran Chin. muriat. bringen die Temperatur um 2° C. herunter. Dabei Excitantien. Am 28. Februar Bäder von 20° , Abends von 24° R.; calor mordax, Pulsus dicrotus. Zunge roth, glatt, trocken. Harn enthält eine Spur Eiweiss. Am 29. Februar ist das Befinden etwas besser, die Zunge kaum noch trocken; mit den Bädern von $20-24^{\circ}$ R., sowie den Scrupeldosen Chinin wird fortgefahren. Die Temp. und Pulsfrequenz sinkt jedoch erst am 4. März merkbar, die Beschaffenheit des Pulses wird normal, und gleichzeitig bessert sich das Befinden, der Blick wird frei, sodass Bäder und Chinin ausgesetzt werden. Starke Schwerhörigkeit (vielleicht Folge des Chinins?) und erhebliche Schwäche bleiben zurück. — Am 9. März wieder vollkommene Euphorie, normaler Stuhlgang, Gehör gut.

Dass es trotz grosser Dosen Chinin und kalter Bäder oft nicht gelingt, das excessive Fieber und die übrigen Symptome zu bekämpfen, wenn man nicht daneben auf die Individualität jedes einzelnen Kranken die erforderliche Rücksicht nimmt, zeigt der folgende

Fall, der uns die wichtige Lehre gibt, mit obigen Mitteln da, wo es nöthig ist, und zwar namentlich bei Potatoren, trotz des enorm gesteigerten Fiebers die dreiste Anwendung von Excitantien, vor Allem von Wein und Branntwein, zu verbinden:

4) Gottfried H. (Curve VII.), Schmiedegeselle. 43 J. alt, wurde am 18. Juni 1867 schon dilirend von der chirurgischen Abtheilung, wo er an Conjunctivitis granulosa behandelt wurde, der medicinischen überwiesen; über den Beginn der Krankheit hatte nichts Anamnestisches ermittelt werden können. Mässig genährter Körper, gedunsenes Gesicht, Augen durch schleimig-eitrige Massen verklebt, Bauch nicht aufgetrieben. Am ganzen Körper deutliches, vielfach confluirendes Exanthem. Fortwährende Delirien. Milz 10 Ctm. lang, 5 Ctm. breit. Zunge mit dickem, braunem Belage, Stuhlgang retardirt, Puls klein, intermittirend, 120 in der Minute. Geringe Albuminurie. Ausser Chinin erhält Pat. Bäder von 24° R. mit kälteren Begiessungen. Gegen Abend wird er comatös; Puls äusserst klein und schnell; er erhielt Wein und Campher. Die furibunden Delirien dauern fort mit Zittern und mimischen Gesichtskrämpfen. Da nachträglich in Erfahrung gebracht wurde, dass Pat. früher täglich $\frac{1}{2}$ Quart Schnaps getrunken, so durfte hier an die Complication eines Delirium tremens gedacht werden. Wein und Campher werden fortgebraucht; dazu Bäder von 28° R. 15 Minuten; kalte Umschläge auf den Kopf, und am 22. Juni auch $\frac{1}{8}$ Quart Schnaps, sodass Pat. am 24. etwas ruhiger und besinnlicher geworden ist. Er hustelt etwas, und im Kehlkopf hört man Rasseln. Vom 25. Juni an beginnt die Temp. erheblich zu fallen, das Exanthem blasst allmählig ab, das Sensorium ist freier, das Zittern jedoch noch vorhanden. Säure in Mixtur. Vom 30. Juni an erhält Pat. täglich statt des Branntweins eine Flasche Wein; gegen die Stuhlverstopfung Klystiere. Am 4. Juli ist Pat. wohl; von den Symptomen ist nur noch grosse Schwäche geblieben, die durch kräftige Diät bekämpft wird. Am 27. Juli ist er so weit hergestellt, dass er wieder auf die chirurgische Klinik verlegt werden kann.

B. Pneumonien.

1) Johann D., Schuhmachergeselle, 72 J. alt, früher im Allgemeinen gesund, bekam am 12. Januar 1866 einen heftigen Schüttelfrost, der 1 Stunde dauerte und dem Kopfweh, Hitze, Husten mit Auswurf, Schmerzen in der rechten Seite folgten. Bei seiner Aufnahme am 13. Januar ergab sich Folgendes: Pat. von kleiner Statur, altersschwach, Muskulatur schlaff. Die Percussion ergibt rechts unten in nächster Nähe der Wirbelsäule ganz leeren, weiter nach der lin. axillaris und aufwärts bis zur Spina scapulae tympanitisch gedämpften Schall, die Auscultation über den ganzen rechten unteren Lungenlappen verbreitetes lautes Bronchial-Athmen, stellenweise Knisterrasseln. Pectoralfremitus beiderseits gleich. Tiefstand der Leber; Milz nicht vergrößert. Urin dunkelroth, mit wenig Eiweiss. Abendtemperatur am 13. 1 = 38,9° C.

14. 1. Morgentemp. 39,2, Abendtemp. 40,2° C. Am Nachmittage neuer Frostanfall. Grosse Benommenheit. Digitalis-Infus.

15. 1. Morgentemp. 39,3. Rechts hinten von der Spina scapulae an gedämpfter Schall, der nach unten intensiver wird; dem entsprechend bronchiales Athmen und einzelne kleinblasige klingende Rasselgeräusche. Pectoralfremitus rechts verstärkt. Sputa crocea, zähe, mit zahlreichen Eiter- und Blutkörperchen. Pat. erhält ʒj Chin. sulphur. in Mixtur, abwechselnd mit Digitalis-Infus. Abendtemp. 38,5° C.

16. 1. Morgentemp. 37,6°. Pat. fühlt sich nach erquickendem Schläfe viel wohler. Hinten rechts unten feuchte Rasselgeräusche. Abendtemp. 38,8° C. Die Pneumonie ist auch auf den mittleren Lappen fortgeschritten.

17. 1. Morgentemp. 36,5. Ruhiger Schlaf in voriger Nacht, Erscheinungen dieselben; auch in der linken Lunge etwas Katarrh. Verordnung: Chinin in Lösung. Abendtemp. 37,2.

Seit diesem Tage fühlt sich Pat. ganz wohl und gekräftigt, das Fieber fällt ab, abendliche Exacerbationen sind nicht mehr zu constatiren. — 25. 1. Verordnung: Chin. sulph. 2mal täglich gr. ij mit Ferrum reductum. — Während Fieber und Schmerzen schon längere Zeit geschwunden waren, wich die Dämpfung an der infil-

irten Stelle erst am 6. Februar. — Am 26. 2. wurde Pat. vollkommen geheilt entlassen.

Die Dauer der Fiebererscheinungen war, wie vorstehende Temperaturangaben zeigen, nur eine sehr kurze, und es trat jedes Mal nach Gebrauch von Chinin ein merklicher Abfall der Temperatur ein, der von einer deutlichen Abnahme der psychischen Erscheinungen und überhaupt einer deutlichen Euphorie begleitet war. Der Fall bietet gleichzeitig eine Bestätigung für Liebermeister's Beobachtung, dass mit Chinin die besten Erfolge bei Pneumonien erzielt werden, wenn es mit Digitalis verbunden wird. Wenn in 4. Falle trotz der strengen Controle und der häufigen Gaben Chinin schliesslich Exitus letalis erfolgte, so dürfen wir hierbei nicht ausser Acht lassen, dass dieser Fall, eine sog. biliöse Pneumonie, besonders schwer verlief, dass dem ohnedies ziemlich atrophischen Patienten nur äusserst wenig respirationsfähiges Lungenparenchym blieb, da der grösste Theil beider Lungen, wie die Autopsie ergab, durch Oedem und Infiltration eingenommen war, dass endlich der Katarrh der Harnwege eine höchst ungünstige Complication bildete.

2) Johann Sch., Knecht, 36 J. alt, mässig genährt, will als Kind Masern und Scharlach, später zweimal ein „Nervenfieber“ gehabt haben und von Jugend auf engbrüstig gewesen sein. In Folge starker Erkältung will er vor 14 Tagen von Kopfschmerz, Schwindel, Ohnmacht, Schwerhörigkeit befallen sein; seine Respirationsbeschwerden hätten sich nicht gesteigert haben. Bei der Aufnahme am 19. September 1867 ergab die physicalische Untersuchung vorn Tiefstand der Lunge bis zur 7. Rippe, hinten unten neben vesiculärem Athmen, vorn rechts, pleuritischen Reiben. Herzdämpfung verschwunden, Herz verkleinert, sonst keine Anomalieen. Geringe Albuminurie. Endtemp. 38° C. Pat. erhält ein Digitalis-Infus, $\mathfrak{Dj}$: $\mathfrak{z}$ vj.

Am 21. 9. rechts und links unten eine Dämpfung, Pectoralfremitus verstärkt, Athmen verschwächt, Knisterrasseln. Neben Digitalis erhält er 2mal täglich Chin. sulph. gr. ij. Abendtemp. 39,6° C.

Am folgenden Morgen Temp. 38,4, Abends 39,1 und Puls 100. In den folgenden Tagen beträgt die Temp. durchschnittlich 38 bis 38,5° C. Sparsame Sputa.

Am 23. 9. zweimal Erbrechen. Statt des Digitalis-Infus 12 Gran Chinin mit Säure. Am 28. 9. mehr und flüssiger, eitelartiger Auswurf, der auf ein Senega-Infus sehr reichlich wird. Am 4. October schon geringerer Auswurf, Appetit kehrt wieder. Puls und Temp. sinken bis auf die Norm, letztere erreicht nur noch am Abend des 7. 10. die Höhe von 39° C. Pat. befindet sich besser, nur sehr schwach; hinten rechts noch Dämpfung, nach unten beiderseits Rasselgeräusche. Am 9. 11. wird Pat., dem bis dahin Senega-Infus weiter gegeben, gänzlich geheilt entlassen.

3) Heinrich S., Nagelschmied, 43 J. alt, leidlich kräftig gebaut, will in seinem 19. Jahre einen Gelenkrheumatismus, eine Lungenentzündung und wiederholt das kalte Fieber überstanden haben. Seit dem 29. December 1867 verspürte er häufige Frost- und Hitzeanfälle und stechenden Schmerz auf der ganzen linken Seite, wurde daher am 30. Decbr. in die medicinische Abtheilung aufgenommen. Der Thorax lässt bei tiefer Inspiration rechts eine in den unteren Partien stärkere Elevation, als links, erkennen. Die Percussion ergibt links hinten eine deutliche Dämpfung, die Auscultation links vorn einige deutliche Rhonchi, hinten in den oberen Partien vesiculäres Athmen mit sparsamen Rasselgeräuschen, unten am 30. Decbr. bronchiales Athmen und pleuritisches Reiben, am 31. bedeutend verschwächtes Athmen und verschwächten Pectoralfremitus. Zähne rostfarbene Sputa. Urin röthlich, mit etwas Eiweiss. Geringe Milzvergrößerung. — Am 31. Morgentemp. 38,6, Abendtemp. 39,2 und Puls 100; in den folgenden Tagen wenig erhöht.

Am 2. 1. 1868 erhält Pat. ein Digitalis-Infus von $\mathfrak{Dj}$: $\mathfrak{Zvj}$.

Am 3. 1. hat die Dämpfung links nach oben zugenommen. Athmen deutlich bronchial. Abendtemp. 39,9.

4. 1. Morgentemp. 39,4, Puls 92. Statt des Digitalis-Infus erhält Pat. eine Säuremischung. Sputa gleichmässig braun. Abendtemp. 39,4.

5. 1. Pat. collabirt, die bisher rothe Gesichtsfarbe ist sehr

reich geworden. Auf der rechten Lunge spärliche Rasselgeräusche. Morgentemp. 39,8. Pat. erhält Rothwein und 1,3 Grammes Chinin mit Säure. Abends links unten circumscripte tympanitische Dämpfung. Abendtemp. 38,8.

In den folgenden Tagen sinkt die Temp. auf die Norm. Am 6. 1. befindet sich Pat. wohl, Husten und Sputa mehren sich, letztere werden flüssiger und klarer.

Am 7. 1. links unten vom angulus scapulae an abwärts deutlich tympanitischer Schall, der Abends auch vorn links deutlich ist. — Am 8. 1. ist die Dämpfung fast verschwunden, links viele feuchte Rasselgeräusche. Am 18. 1. keine Residuen der Pneumonie; links unten nur noch eine kleine Dämpfung von der complicirenden Pleuritis. Pat. verlässt heute das Bett und wird am 12. Februar völlig geheilt entlassen.

4) Friedrich J., Schiffszimmermann, 30 J. alt, von mässig gehärtetem Körper, früher bis auf eine Intermittens und ein vor 3 Jahren überstandenes Gelenkleiden immer gesund, bekam vor 7 Tagen nach einem Schüttelfrost Stiche in der rechten Seite mit allmählich zunehmender Athemnoth und Auswerfen zäher, blutig gefärbter Massen. Nachdem er einige Tage in poliklinischer Behandlung gewesen, wurde er am 30. Januar 1868 in das Krankenhaus aufgenommen. Ist cyanotisch, Haut feucht. Oberflächliche Respiration. In der regio supraclavicularis beiderseits sonorer Schall, in der reg. infraclavicularis etwas tympanitisch gedämpft. In der reg. supraspinata sinistra keine Dämpfung, nach abwärts dagegen gedämpfter, doch nicht leerer Schall. In der reg. interscapularis dextra tympanitischer Klang. Von der reg. interscapularis sinistra bis nach abwärts bronchiales In- und Exspirium, ebenso rechts. — Sputa crocea, mit Eiterbläschen untermischt. Der hochgestellte Harn enthält Eiweiss, Inducylinder und Gallenfarbstoff. Abendtemp. 38, Puls 116, Respirations-Frequenz 66. Kalte Umschläge, Excitantien und 1,3 Gramme Chinin mit Säure.

31. 1. Morgentemp. 39,2, Puls 128, Athemfrequenz 70. Abends auch höher oben links bronchiales Athmen hörbar, im Allgemeinen deutlicher, als rechts.

1. 2. Pat. befindet sich schlecht; reichliche Schweisse. Morgentemp. 38, Mittags 39, Nachmittags 38,2; Abendtemp. 39,6. Respiration 70. Stiche in der rechten Seite. Abends rechts hinten

unten und links fast auf der ganzen hinteren Partie Knisterrasseln. Ausser obiger Säuremixtur mit Chinin erhält Pat. noch 3mal 0,12 Grammes Chinin pro die.

2. 2. Morgentemp. 39, Puls 120, Athemfrequenz 66; Abendtemp. 39,2. Rechts unten noch mehr Rasselgeräusche. 12 trockene Schröpfköpfe auf die Brust, und zu obiger Mixtur noch Chin. sulph. 0,6 Grammes.

3. 2. Temp., Puls- und Athemfrequenz bedeuten gesunken; Pat. befindet sich besser, Athemnoth gering. Rechts oben feinblasige Rasselgeräusche, rechts unten tympanitisch Schall.

4. 2. Rechts wieder überall Knisterrasseln. Chinin und Säure fortgebraucht. Abendtemp. 39,2. — Abends rechts im oberen Lappen eine neue pneumonische Infiltration mit Dämpfung und Knisterrasseln. Obwohl im Harn nur wenig Cholepyrrhin, sind die Fäces doch entfärbt. Am Nachmittag war Pat. somnolent geworden, daher Rothwein und ein Ipecacuanha-Infus mit Moschus.

5. 2. Befinden besser; rechts und links unten feuchte Rasselgeräusche; rechts oben bronchiales Athmen; links fast normale Lungenschall. Statt obiger Mixtur Chin. sulph. grms. 0,9. Abendtemp. 39,1. Bis zum 12. 2. leidliches Befinden, die Symptome abnehmen. Am 12. klagt Pat. über Brustbeklemmung und Seitenschmerzen in Folge einer leichten linksseitigen Pleuritis; die Temp. nicht gestiegen. Er erhält ein Digitalis-Infus von 1:200.

Am 23. 2. befindet er sich wieder wohl, überall vesiculäres Athmen, nur an einer kleinen Stelle rechts oben ist es noch bronchial. Dämpfung kaum noch nachzuweisen. Geringes Sputum.

In der Nacht zum 26. 2. wieder halbstündiger heftiger Schüttelfrost, blutig gefärbte Sputa. Rechts hinten circumscriptes Knisterrasseln etwas unter der Scapula, entsprechend einer leichten Dämpfung. Digitalis-Infus von 1:150. Temp. nicht bedeutend erhöht.

27. 2. Mittags neuer halbstündiger Schüttelfrost, Schweiß und geringe Erleichterung folgt. Zweimal grms. 0,3 Chin. muriat. und ein Chinadecoct mit Säure.

1. 3. Von Neuem zweimaliger Schüttelfrost mit nachfolgendem Erbrechen. Pat. klagt über starken Husten und Beklemmung.

2. 3. Abendtemp. wieder 39,2. — Athemnoth und Beklemmung nehmen am folgenden Tage zu; in der reg. supra- und infraclavicularis rechts, ebenso nach unten eine kleine Dämpfung, der entsprechend wieder bronchiales Athmen deutlich zu hören ist. Bedeutende Schwäche des Pat. Im Harn wieder Gallenfarbstoff, doch kein Eiweiss. Abendtemp. 39,0.

4. 3. Morgentemp. **35,8**, Puls 126. Erbrechen. Bald darauf Exitus letalis

Der Obductionsbefund, der in beiden Lungen ausgesprochenes Oedem, Hypostase, ausgebreitete Infiltration, frische Pleuritis, ferner in den Harnwegen einen starken Katarrh ergab, macht den Ausgang dieses so schwer, mit immer neuen Attaquen, mit so häufig schwankender Prognose verlaufenen Falles sehr erklärlich. Trotzdem lässt sich nicht verkennen, dass die Chiningaben jedes Mal eine momentane Besserung zur Folge hatten.

Lebenslauf.

Siegfried Walbaum aus Münster, geboren am 21. Mai 1847, Sohn des dortigen Regierungs-Secretairs Abraham Walbaum und der leider schon früh verstorbenen Gerta, geb. Simon, jüdischer Confession, besuchte 7 Jahre hindurch, von 1857 bis 1864, das dortige Paulinische Gymnasium unter Leitung des Herrn Direktors Dr. Ferd. Schultz, jetzigen Provinzial-Schulraths. Nachdem er am 13. August 1864 daselbst das Abiturienten-Examen gemacht hatte, bezog er im October 1864 die Universität Greifswald, um sich dem Studium der Medicin zu widmen, wurde am 20. October vom derzeitigen Rector, Herrn Prof. Dr. Baier immatriculirt und am 21. October 1864 vom damaligen Prodecan, Herrn Prof. Dr. Pernice, in das Album der medicinischen Facultät eingetragen. Er absolvirte am 14. Juli 1866 das Tentamen physicum und am 11. Juli 1868 das Examen rigorosum.

Während dieser 8 Semester hörte er folgende Vorlesungen:

Osteologie, Myologie, Syndesmologie und Splanchnologie;
Anatomie der Sinnesorgane; Experimentalphysiologie;
Physiologie der Sinnesorgane beim Herrn Prof. Dr.
Budge.

Anatomie des Nerven- und Gefässsystems; Anatomie des Gehirns und Rückenmarks beim Herrn Professor Dr. Schultze.

Mikroskopische Anatomie; Entwicklungsgeschichte; vergleichende Anatomie beim Herrn Dr. Landois.

Allgemeine Experimentalphysik; Repetitorium der Physik beim Herrn Prof. Dr. v. Feilitzsch.

Allgemeine und specielle Zoologie; botanische Excursionen beim Herrn Prof. Dr. Münster.

Anorganische Chemie; organische Chemie beim Herrn Prof. Dr. Limpricht.

Repetitorium der Chemie beim Herrn Dr. Otto.

Allgemeine pathologische Anatomie; specielle pathologische Anatomie beim Herrn Prof. Dr. Grohe.

Specielle Arzneimittellehre; Repetitorium der Arzneimittellehre; chirurgische Verbandlehre beim Herrn Prof. Dr. Laurer.

Specielle Pathologie und Therapie; Psychiatrie; über physikalische Diagnostik beim Herrn Prof. Dr. Mosler.

Ueber Nahrungsmittel und Diätetik beim Herrn Dr. Bengelsdorff.

Allgemeine und specielle Chirurgie; Akiurgie; über Knochenbrüche und Verrenkungen; über einzelne Abschnitte der Chirurgie beim Herrn Prof. Dr. Bardeleben.

Theorie der Geburtshülfe beim Herrn Prof. Dr. Pernice.

Augenheilkunde; über Augenoperationen beim Herrn Prof. Dr. Schirmer.

Hautkrankheiten beim Herrn Prof. Dr. Hertz.

Ueber gerichtliche Medicin; über medicinische Polizei beim Herrn Dr. Haeckermann.

Ausserdem besuchte er:

Die Präparirübungen; den mikroskopisch-physiologischen Cursus unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Budge.

**Den praktischen Cursus der pathologischen Anatomie und
Physiologie unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Grohe;**

und practicirte:

**Im chemischen Institut unter Leitung des Herrn Prof. Dr.
Limpricht.**

**In der geburtshülflichen Klinik und Poliklinik unter Leitung
des Herrn Prof. Dr. Pernice.**

**In der medicinischen Klinik und Poliklinik unter Leitung
des Herrn Prof. Dr. Mosler.**

**In der chirurgischen und augenärztlichen Klinik, sowie im
Operations-Cursus unter Leitung des Herrn Prof. Dr.
Bardleben.**

**Im Cursus für die Diagnose der Augenkrankheiten, sowie im
ophthalmoskopischen Cursus unter Leitung des Herrn
Prof. Dr. Schirmer.**

**Verfasser benutzt diese Gelegenheit, um allen seinen ver-
ehrten Lehrern hier seinen wärmsten Dank auszusprechen.**

T h e s e n.

I.

Benzin ist ein vortreffliches Anthelminthicum.

II.

Der Gypsverband ist im Stande, durch Contraction des Gypses nach und nach weiter zu werden.

III.

Tetanus nach Verwundungen der Finger deutet häufig schon den Beginn der septicämischen Erscheinungen an.

IV.

Der Gasbrenner ist zum Cauterisiren lupöser Stellen nicht zu empfehlen.



